

エーサロンパス®ジェット^α

スプレー式鎮痛消炎剤

商品の特長

- サリチル酸グリコールによる鎮痛消炎効果と優れた冷却効果のスプレー剤です。
- 患部にスプレーすると、炎症を抑え、痛みを鎮め、筋肉痛、筋肉疲労などに優れた効果を発揮します。
- 微香性なので周囲の人に気を使わずに使用できます。

⚠ [使用上の注意]

☒ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ・かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】筋肉疲労、筋肉痛、肩こり、腰痛、打撲、ねんざ、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】1日数回、適量を患部に噴霧してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3)大量・広範囲には使用しないでください。
- (4)外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入により、めまい、吐き気等の症状を起こすことがありますので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。
- (5)患部まで10cmの距離で噴霧してください。
- (6)同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないでください(凍傷になるおそれがあります)。

【成分・分量】

成分	含量(原液100mL中)
β-メントール	10.0g
サリチル酸グリコール	2.0g
グリチルレチン酸	0.2g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、1,3-ブチレングリコール、無水エタノール、DMEを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップを閉めて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)本剤が衣類や家具、皮革製品、化成品等に付着しないように注意してください。変質又は変色するおそれがあります。
- (5)火気に近づけないでください。
- (6)火花が出る所で使用しないでください。

《包装》100mL、150mL、300mL


【廃棄の際のガス抜きの注意事項と方法】**〈ガス抜きの注意事項〉**

- ・必ず中身を使い切ってから、火気のない風通しのよい屋外で行ってください。
- ・ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。
- ・本品のキャップ以外は使用しないでください。
- ・噴射されるガスを直接吸い込まないよう注意してください。

〈ガス抜きの方法〉

※下図は商品の説明書です。サンプル品は構造が異なります。

- ①押しボタンを
引き抜きます。
- ②キャップの上部をはずし、
平らな所に伏せて置きます。
- ③キャップの天面中央の穴に本体
を逆さまにして押し込み、噴射音
が消えるまで放置します。
- ④噴射音が完全に消えてから、
市町村等で定められた方法
により破棄してください。



▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：0120-133250 受付時間／9:00～17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)