

筋肉・関節の痛みに、清涼感のあるゲル剤

フェイタス[®] ゲル

微香性
経皮鎮痛消炎剤

商品の特長

- フェイタスゲルは、優れた抗炎症・鎮痛効果が認められている「フェルビナク」を主成分(3%配合)とした経皮鎮痛消炎剤です。
- 「フェルビナク」は痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みに優れた効きめをあらわします。
- L-メントールを3.0%配合なので、さわやかな使用感です。
- 清涼感のあるアルコールゲル基剤を使用した、楽に塗り伸ばせる乾きの速い製剤です。

⚠ [使用上の注意]**☒ してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]**1. 次の人は使用しないでください。**

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ぜんそくを起こしたことがある人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- 目の周囲、粘膜等。
- 湿疹、かぶれ、傷口。
- 化膿している患部。

相談すること**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。**

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間くらいの使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、ねんざ、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】 1日2~4回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】

成分	含量(100g中)	働き
フェルビナク	3.0g	炎症を抑え、痛みをやわらげます。
l-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物として、アジピン酸ジイソプロピル、エタノール、エデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、八アセチルショ糖、ヒブロメロース、プロピレングリコールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると
変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても
なるべく速やかに使用してください。

《包 装》 50g

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** ☎ 841-0017 鳥栖市田代大宮町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

久光製薬お客様相談室：☎ 0120-133250 受付時間／9:00—17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元 **東光薬品工業株式会社** ☎ 123-0865 東京都足立区新田2-16-23