

**商品の特長**

- シップ独特の「におい」をなくした、ここちよい冷感の〈無臭性〉鎮痛消炎シップ剤。
- 薄く軽いので、使用部位にしっかりと密着。
- シップの角を丸くすることで衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在で、関節部位にもぴったりフィット。
- フィルムがはがしやすく、貼りやすいシップです。
- 1枚ずつ取り出しやすく、コンパクトな包材の「ポケシップ®」です。

**⚠ [使用上の注意]****☒ してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

【用法・用量】1日1~2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

【成分・分量】

| 成分 | 含量(膏体100g中) |
|---------------|-------------|
| サリチル酸グリコール | 2.0g |
| トコフェロール酢酸エステル | 1.0g |

添加物として、エドト酸ナトリウム水和物、ブリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、パラベン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミニウムマグネシウム、その他4成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

《包 装》10cm × 14cm……………10枚入、20枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)