

# Hisamitsu® ロキソプロフェン<sup>Na</sup>テープ<sup>α</sup>大判

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

## 商品の特長

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェンナトリウム水和物を配合。
- ロキソプロフェンナトリウム水和物の他に「 $\ell$ -メントール(鎮痛補助成分)」と「トコフェロール酢酸エステル(血行促進成分)」を追加配合、3つの有効成分が直接患部に作用します。
- 微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
- 全方向伸縮で肌にピッタリフィットします。
- 保存に便利なチャック付きです。

## ⚠️ [使用上の注意]

**❌ してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 15歳未満の小児

### 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

### 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

### 4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

## 🗨️ 相談すること

### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4) 高齢者
- (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

### 3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢・軟便

### 4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性あります)

**【効能・効果】** 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

**【用法・用量】** 表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)1日あたり2枚を超えて使用しないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

**【成分・分量】**

成分	膏体100g中[1枚あたり(10cm×14cm)膏体量2g]
ロキソプロフェンナトリウム水和物	5.67g(無水物として5g)
ℓ-メントール	3.00g
トコフェロール酢酸エステル	2.30g

添加物：ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロジングリセリンエステル、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシルエン、その他3成分

**保管及び取扱い上の注意**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管してください。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

《包装》10cm×14cm……………7枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

久光製薬お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元  **祐徳薬品工業株式会社** 〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1