

光接触皮膚炎を 防ぐために

患者さんへのご説明のお願い

監修：久留米大学医学部 皮膚科学教室 主任教授
名嘉真 武國 先生

ケトプロフェン外用剤を使用中・使用後、貼ったところに日光(紫外線)があたると光接触皮膚炎が発現することがあります。光接触皮膚炎は使用中・使用後の注意を守ることにより防ぐことができる副作用です。

裏面をご参考に患者さんへご説明をお願いいたします。

以下のグラフは出荷数量あたりのモーラス[®]テープ20mgによる光接触皮膚炎の自発報告での例数推移になります。先生方のおかげで、2002年の0.24をピークとし、2023年は0.02となりました。

引き続き**使用中・使用後の注意喚起**をよろしくお願いいたします。

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンテープ

モーラス[®]テープ[®] 20mg

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンテープ

モーラス[®]テープ[®] L 40mg

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンパップ

モーラス[®]パップ[®] XR 120mg

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンパップ

モーラス[®]パップ[®] XR 240mg

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンパップ

モーラス[®]パップ[®] 30mg

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンパップ

モーラス[®]パップ[®] 60mg

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンクリーム

セクター[®]クリーム 3%


経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンゲル

セクター[®]ゲル 3%

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェンローション

セクター[®]ローション 3%

2023年12月までのモーラス[®]テープ20mgの出荷数量100万枚あたりの光接触皮膚炎と接触皮膚炎の報告例数のグラフ



川島 佳奈子、末永 裕、吉武 和久、日野 龍也、上出 良一、南 秀尚：
ケトプロフェン外用剤による光接触皮膚炎 - 安全対策と報告例数の推移 -。
Prog Med 2019; 39 (2) :189-197. を元に作成 (2023年までのデータに更新)

光接触皮膚炎を防ぐために

光接触皮膚炎は 使用中・使用後の注意を守って
いただくことで防ぐことができる副作用です



患者さんへの確認チャート

光線過敏症の既往歴がありますか？
もしくはオキシベンゾンやオクトクリレンを含有した
化粧品・日焼け止めがかぶれたことはありますか？

はい

これらの患者さんは**禁忌**です。
他の薬剤に変更するなどご検討を
お願いいたします。

はい

ケトプロフェン外用剤を使って、発疹・発赤、痒み、
かぶれ等（接触皮膚炎や光接触皮膚炎等）が
発現したことはありますか？

いいえ

いいえ

日常生活、屋外でのスポーツや作業の際、
使用する部位は日光にさらされますか？

はい

患者さんへ
右記の点を
ご指導ください

- 使用部位を紫外線が通りにくい衣服（長袖、長ズボン）あるいはサポーター等で紫外線があたらないように覆うこと。
曇りの日でも同様の注意が必要です。
- 使用後、少なくとも4週間は、引き続き使用部位に紫外線をあてないように注意をはらうこと。衣服で覆えない場所（首など）は日焼け止めで紫外線を防ぐこと。日焼け止めは紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）のものをお勧めします。

患者さんには以下の点もご指導をお願いします

- 他の人に譲り渡しをしないこと。
- 処方された部位以外への使用はしないこと。



指導箋のご紹介

弊社では、光接触皮膚炎を防ぐために、
患者さんへの服薬指導の一助となるよう
患者指導箋等をご用意しております。

ご希望の方は、弊社医薬情報担当者まで
ご連絡いただきますようお願いいたします。
また、「Hisamitsu サポートウェブ」からも
取り寄せることができます。



患者指導箋



おやすり手帳用付箋

文献請求先及び問い合わせ先

久光製薬株式会社 お客様相談室

〒135-6008 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
TEL.0120-381332 FAX.(03)5293-1723
受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

医療関係者向け情報サイト

Hisamitsu サポートウェブ

医療現場でご活用いただけるお役立ち情報やサービス
をお届けしています！ぜひ、ご登録ください。

久光サポートウェブ



<https://www.hisamitsu-pharm.jp>



- 無断転用・転載はご遠慮ください。
- 患者さん向けの資料ではありません。

