

2021年9月

医療関係者 各位

久光製薬株式会社

経皮鎮痛消炎剤

ケトプロフェン クリーム

セクター[®]クリーム 3%
SECTOR[®] Cream 3%

変動情報入り GS1 コード表示に伴う包装仕様変更のご案内<追記>

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社商品に格別のご高配をいただき厚く御礼申し上げます。

この度、経皮鎮痛消炎剤 セクター[®]クリーム3% に関して、販売包装単位に変動情報を含んだ GS1 コードを表示するようにいたしました。

それに伴い包装仕様を下記の通り変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも本商品をご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【変更内容】

- 商品名の英語表記追加に伴う商品名ロゴを変更
- 変動情報(使用期限・製造番号)を含んだ GS1 コード表示に変更
- 商品名ロゴの変更に伴う個装箱・梱包箱のデザイン変更
- 個装箱の開封口の表記を変更
- 封入指導箋の記載内容を変更


【変更品の初回製造番号及び当社出荷予定時期】

商品名	包装	統一商品コード	GS1コード		初回製造番号	使用期限	当社出荷予定時期
			調剤包装単位	販売包装単位			
セクタークリーム3%	25g/1本×10本	188413012	(01)04987188201312	(01)14987188413019	10101	2024年1月	2021年2月中旬
	50g/1本×50本	188413555	(01)04987188201329	(01)14987188413552	10102	2024年2月	2021年9月中旬


※ 統一商品コード、GS1 コードに変更はございません。

※ 入数、サイズ、重量に変更はございません。

■商品名の英語表記追加に伴う商品名ロゴの変更点





■個装箱のGS1コード表示面・商品名ロゴ・開封口表記の変更点 ※ 原寸大ではございません



- ※ 上記イラストは、セクタークリーム3% 25g/1本×10本の個装箱のデザインですが、50g/1本×50本の個装箱に付きましても、同様の変更を行っております。
- ※ GS1コードを表示する面は、変更ございません。

■封入指導箋の記載内容の変更点

変更前		変更後	
＜表面＞	＜裏面＞	＜表面＞	＜裏面＞
<p>効果的な使い方</p> <p>＜使用方法＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ●1日数回、痛いところを中心に軽くすり込んでください。 ●関節部位に使う場合は、そのまわり全体に軽くすり込んでください。 ●お風呂上がりの使用は、より効果的です。 <p>＜使用量の目安＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ●1回の使用量は患部により異なります。 ●人差指関節（図を参照）に相当する量を1回分として、以下を目安にご使用ください。 <p>ひざ、肩、腰など……1～2回分 ひじ、手首など……1回分 手足の指など……1/2回分</p>  <p>人差指</p>	<p>＜注意＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ●眼や粘膜面、きず口には使用しないでください。 ●本剤の使用により、皮膚のかゆみ、又は、直射日光等でのかぶれなどの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。 ●使用後はキャップをしめ、なるべく涼しいところに保管してください。 ●乳幼児の手のとどかないところに保管してください。 <p>4-0AO (SC) 4J123C</p>	<p>Hisamitsu. セワターがゆきを 使用されている方へ</p> <p>ご使用にあたって</p> <p>＜使用方法＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ●1日数回、痛いところを中心に軽くすり込んでください。 ●関節部位に使う場合は、そのまわり全体に軽くすり込んでください。 <p>＜使用量の目安＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ●1回の使用量は患部により異なります。 ●人差指関節（図を参照）に相当する量を1回分として、以下を目安にご使用ください。 <p>ひざ、肩、腰など……1～2回分 ひじ、手首など……1回分 手足の指など……1/2回分</p>  <p>人差指</p>	<p>＜注意＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ●眼や粘膜面、きず口には使用しないでください。 ●本剤の使用により、皮膚のかゆみ、又は、直射日光等でのかぶれなどの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。 ●使用後はキャップをしめ、なるべく涼しいところに保管してください。 ●乳幼児の手のとどかないところに保管してください。 <p>作成：久光製薬株式会社 (SC) 5J123C</p>

※ 会社名・商品名を記載するよういたしました。

※ 「お風呂上がりの使用は、より効果的です。」の記載を削除しました。

■変更の際し、変更前と変更後の商品が流通することにより、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

以上