

抗マラリア剤

処方箋医薬品（注意-医師等の処方箋により使用すること）

メフロキン塩酸塩錠

薬価基準収載

メファキン「ヒサミツ」錠275

MEPHAQUIN HISAMITSU Tablets 275

添付文書の電子化・同梱廃止に伴う商品仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社商品に格別のご高配をいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、抗マラリア剤『メファキン「ヒサミツ」錠 275』につきまして、添付文書の電子化・同梱廃止に伴う商品仕様の変更をいたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご愛顧をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

久光製薬株式会社

【調剤包装単位(PTP)の変更内容】 ※諸事情により、下線部分につきましては2025年12月頃の変更となります。

- 商品名ロゴを変更
- 薬効分類名「抗マラリア剤」を追加

【販売包装単位(ケース・中袋)の変更内容】

- 商品名ロゴを変更
- 開封ミシン目を追加し、「開封口」、「開封済」を表示
- 「成分」と「含量」を『組成』に変更
- 中袋を廃止し、服薬告知書・封入指導箋をケースに封入

【中間箱の変更内容】

- サイズを縮小
- 商品名ロゴを変更
- 「成分」と「含量」を『組成』に変更
- お客様相談室の表示を削除

【服薬告知書の変更内容】

- サイズを縮小
- 記載内容を一部変更

【封入指導箋の変更内容】

- 記載内容を一部変更

【変更品の初回製造番号および当社出荷予定時期】

商品名	包装	統一商品コード	初回製造番号	使用期限	当社からの出荷予定時期
メファキン「ヒサミツ」錠275	6錠(PTP6錠×1シート)	188491812	30106	2028年6月	2024年1月上旬

※統一商品コード、GS1コードなどの各種コードに変更はありません。

※商品入数に変更はありません。

※変更品の出荷時期は、在庫状況により前後する場合があります。


■変更の際しましては、変更前と変更後の商品が流通することにより、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

【服薬告知書・中間箱のサイズ縮小】


商品名	包装	服薬告知書サイズ<縦×横(mm)>		中間箱サイズ<幅×奥行×高さ(mm)>	
		現行品	変更品	現行品	変更品
メファキン「ヒサミツ」錠275	6錠(PTP6錠×1シート)	105×148	95×148	210×160×80	185×108×49

【調剤包装単位(PTP)の変更内容】


※諸事情により、下記調剤包装単位(PTP)につきましては2025年12月頃の変更となります。



【販売包装単位(ケース)の変更内容】



【中間箱の変更内容】



【服薬告知書の変更内容】

<p>現行品</p> <p>【表面】</p> <p>お医者様へ 私はマラリア感染の予防のため、WHOが必須薬剤に指定している、メフロキン塩酸塩というキノリンメタノール誘導体を服用しています。</p> <p>① 「クスリ」と知られている主な副作用は、嘔気、腹部膨満感、胃部不快感、めまい、ふらつき、頭痛、尋麻疹、精神障害、平衡感覚異常等です。</p> <p>血液学的には、AST(GOT)、ALT(GPT)、CK、TTT、ZTT、好酸球の上昇があります。</p> <p>② 「クスリ」の血中濃度半減期は、およそ16日です。</p> <p>200802</p> <p>服薬告知書</p> <p>※この「クスリ」を「飲んで」いる、病医院にかかる方は、お医者様様に「本告知書を見て、この「クスリ」を「飲んで」るをお伝えください。</p>	<p>変更品</p> <p>【表面】</p> <p>お医者様へ 私はマラリア感染の予防のため、WHOが必須薬剤に指定している、メフロキン塩酸塩というキノリンメタノール誘導体を服用しています。</p> <p>① 「お薬」と知られている主な副作用は、嘔気、腹部膨満感、胃部不快感、めまい、ふらつき、頭痛、尋麻疹、精神障害、平衡感覚異常等です。</p> <p>血液学的には、AST(GOT)、ALT(GPT)、CK、TTT、ZTT、好酸球の上昇があります。</p> <p>② 「お薬」の血中濃度半減期は、およそ16日です。</p> <p>330002</p> <p>服薬告知書</p> <p>※この「お薬」を「服用して」いる、病医院にかかる方は、お医者様様に「本告知書を見て、この「お薬」を「服用して」いるをお伝えください。</p>
<p>【裏面】</p> <p>Dear Doctors, I am taking a quinolin methanol derivative called "mefloquine hydrochloride," which is designated as one of the essential drugs by WHO, for prophylaxis against infection of malaria.</p> <p>③ 「abdominal distension NOS」 and 「bloating」 are terms used to describe the following symptoms: abdominal distension, hiccups, indigestion, mental disorder, abnormal sense of equilibrium, etc.</p> <p>As for blood findings, elevation of AST(GOT), ALT(GPT), CK, TTT, ZTT and eosinophil can be induced by the drug.</p> <p>The biological half life (T_{1/2}) of "mefloquine hydrochloride" is approximately 16 days.</p> <p>Señores Doctores, Yo he tomado la medicina quinolin metanol inductor llamado "ácido clorhidrico mefloquine" para la prevención de la infección contra la malaria, que es designado medicamento indispensable por el WHO.</p> <p>Los efectos secundarios principales que se conoce de dicha medicina son, náusea, distensión abdominal, gástrico desagradable, vértigo, tambaleo, dolor de cabeza, articular, deficiente mental, sentido del equilibrio anormal, etc.</p> <p>Según la hematólogía, se puede localizar la elevación de AST(GOT), ALT(GPT), CK, TTT, ZTT, leucocito.</p> <p>La concentración sanguínea media biológica (T_{1/2}) del "ácido clorhidrico mefloquine" es aproximadamente de 16 días.</p>	<p>【裏面】</p> <p>Dear Doctors, I am taking a quinolin methanol derivative called "mefloquine hydrochloride," which is designated as one of the essential drugs by WHO, for prophylaxis against infection of malaria.</p> <p>③ 「abdominal distension NOS」 and 「bloating」 are terms used to describe the following symptoms: abdominal distension, hiccups, indigestion, mental disorder, abnormal sense of equilibrium, etc.</p> <p>As for blood findings, elevation of AST(GOT), ALT(GPT), CK, TTT, ZTT and eosinophil can be induced by the drug.</p> <p>The biological half life (T_{1/2}) of "mefloquine hydrochloride" is approximately 16 days.</p> <p>Señores Doctores, Yo he tomado la medicina quinolin metanol inductor llamado "ácido clorhidrico mefloquine" para la prevención de la infección contra la malaria, que es designado medicamento indispensable por el WHO.</p> <p>Los efectos secundarios principales que se conoce de dicha medicina son, náusea, distensión abdominal, gástrico desagradable, vértigo, tambaleo, dolor de cabeza, articular, deficiente mental, sentido del equilibrio anormal, etc.</p> <p>Según la hematólogía, se puede localizar la elevación de AST(GOT), ALT(GPT), CK, TTT, ZTT, leucocito.</p> <p>La concentración sanguínea media biológica (T_{1/2}) del "ácido clorhidrico mefloquine" es aproximadamente de 16 días.</p>

①:「クスリ」を「お薬」に変更
②:「飲んで」を「服用して」に変更
③:「abdominal distension NOS」を「bloating」に変更
④:「headache」を追加

【封入指導箋の変更内容】

<p>現行品</p> <p>【表面】</p> <p>メファキン「ヒタシ」錠275をのまれる方へ</p> <p>①</p> <p>【メファキンの服用について】 メファキンはマラリアの予防薬です。マラリアの予防には、メファキンを毎日1錠（275mg）服用する必要があります。メファキンを服用する際は、必ずお医者様から処方された通りに服用してください。</p> <p>【メファキンの副作用について】 メファキンを服用すると、嘔気、腹部膨満感、胃部不快感、めまい、ふらつき、頭痛、尋麻疹、精神障害、平衡感覚異常などの副作用が生じる場合があります。</p> <p>【メファキンの禁忌について】 メファキンを服用する際は、以下の禁忌事項に注意してください。</p> <p>【メファキンの注意について】 メファキンを服用する際は、以下の注意事項に注意してください。</p> <p>【メファキンの保存について】 メファキンを服用する際は、以下の保存方法に注意してください。</p> <p>【メファキンの廃棄について】 メファキンを服用する際は、以下の廃棄方法に注意してください。</p> <p>【メファキンのお問い合わせ先】 メファキンのお問い合わせ先は、お医者様またはお薬手帳に記載の薬局です。</p> <p>②</p>	<p>【裏面】</p> <p>②</p> <p>【メファキンの服用について】 メファキンはマラリアの予防薬です。マラリアの予防には、メファキンを毎日1錠（275mg）服用する必要があります。メファキンを服用する際は、必ずお医者様から処方された通りに服用してください。</p> <p>【メファキンの副作用について】 メファキンを服用すると、嘔気、腹部膨満感、胃部不快感、めまい、ふらつき、頭痛、尋麻疹、精神障害、平衡感覚異常などの副作用が生じる場合があります。</p> <p>【メファキンの禁忌について】 メファキンを服用する際は、以下の禁忌事項に注意してください。</p> <p>【メファキンの注意について】 メファキンを服用する際は、以下の注意事項に注意してください。</p> <p>【メファキンの保存について】 メファキンを服用する際は、以下の保存方法に注意してください。</p> <p>【メファキンの廃棄について】 メファキンを服用する際は、以下の廃棄方法に注意してください。</p> <p>【メファキンのお問い合わせ先】 メファキンのお問い合わせ先は、お医者様またはお薬手帳に記載の薬局です。</p>
<p>変更品</p> <p>【表面】</p> <p>メファキン「ヒタシ」錠275を服用される患者さんへ</p> <p>①</p> <p>【メファキンの服用について】 メファキンはマラリアの予防薬です。マラリアの予防には、メファキンを毎日1錠（275mg）服用する必要があります。メファキンを服用する際は、必ずお医者様から処方された通りに服用してください。</p> <p>【メファキンの副作用について】 メファキンを服用すると、嘔気、腹部膨満感、胃部不快感、めまい、ふらつき、頭痛、尋麻疹、精神障害、平衡感覚異常などの副作用が生じる場合があります。</p> <p>【メファキンの禁忌について】 メファキンを服用する際は、以下の禁忌事項に注意してください。</p> <p>【メファキンの注意について】 メファキンを服用する際は、以下の注意事項に注意してください。</p> <p>【メファキンの保存について】 メファキンを服用する際は、以下の保存方法に注意してください。</p> <p>【メファキンの廃棄について】 メファキンを服用する際は、以下の廃棄方法に注意してください。</p> <p>【メファキンのお問い合わせ先】 メファキンのお問い合わせ先は、お医者様またはお薬手帳に記載の薬局です。</p> <p>②</p>	<p>【裏面】</p> <p>②</p> <p>【メファキンの服用について】 メファキンはマラリアの予防薬です。マラリアの予防には、メファキンを毎日1錠（275mg）服用する必要があります。メファキンを服用する際は、必ずお医者様から処方された通りに服用してください。</p> <p>【メファキンの副作用について】 メファキンを服用すると、嘔気、腹部膨満感、胃部不快感、めまい、ふらつき、頭痛、尋麻疹、精神障害、平衡感覚異常などの副作用が生じる場合があります。</p> <p>【メファキンの禁忌について】 メファキンを服用する際は、以下の禁忌事項に注意してください。</p> <p>【メファキンの注意について】 メファキンを服用する際は、以下の注意事項に注意してください。</p> <p>【メファキンの保存について】 メファキンを服用する際は、以下の保存方法に注意してください。</p> <p>【メファキンの廃棄について】 メファキンを服用する際は、以下の廃棄方法に注意してください。</p> <p>【メファキンのお問い合わせ先】 メファキンのお問い合わせ先は、お医者様またはお薬手帳に記載の薬局です。</p> <p>③</p>

①:タイトルを変更
②:一部内容を変更
③:服薬告知書のイメージ図を追加

※その他、一部デザイン・配置も変更しております。

医療関係者向け情報サイト

Hisamitsu サポートウェブ

医療現場でご活用いただけるお役立ち情報やサービスをお届けしています！ぜひ、ご登録ください。

久光サポートウェブ

<https://www.hisamitsu-pharm.jp>



〈文献請求先及び問い合わせ先〉

久光製薬株式会社 お客様相談室

〒135-6008 東京都東区豊洲三丁目3番3号 TEL.0120-381332 FAX.(03)5293-1723 受付時間/9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

抗マラリア剤

処方箋医薬品（注意-医師等の処方箋により使用すること）

メフロキン塩酸塩錠

薬価基準収載

メファキン「ヒサミツ」錠275

MEPHAQUIN HISAMITSU Tablets 275

添付文書の電子化・同梱廃止に伴う商品仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社商品に格別のご高配をいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、抗マラリア剤『メファキン「ヒサミツ」錠 275』につきまして、添付文書の電子化・同梱廃止に伴う商品仕様の変更をいたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご愛顧をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

久光製薬株式会社

【調剤包装単位(PTP)の変更内容】

- 商品名ロゴを変更
- 薬効分類名「抗マラリア剤」を追加

【販売包装単位(ケース・中袋)の変更内容】

- 商品名ロゴを変更
- 開封ミシン目を追加し、「開封口」、「開封済」を表示
- 「成分」と「含量」を『組成』に変更
- 中袋を廃止し、服薬告知書・封入指導箋をケースに封入

【中間箱の変更内容】

- サイズを縮小
- 商品名ロゴを変更
- 「成分」と「含量」を『組成』に変更
- お客様相談室の表示を削除

【服薬告知書の変更内容】

- サイズを縮小
- 記載内容を一部変更

【封入指導箋の変更内容】

- 記載内容を一部変更

【変更品の初回製造番号および当社出荷予定時期】

商品名	包装	統一商品コード	初回製造番号	使用期限	当社からの出荷予定時期
メファキン「ヒサミツ」錠275	6錠(PTP6錠×1シート)	188491812	30106	2028年6月	2024年1月上旬

※統一商品コード、GS1コードなどの各種コードに変更はありません。

※商品入数に変更はありません。

※変更品の出荷時期は、在庫状況により前後する場合があります。

■変更の際しましては、変更前と変更後の商品が流通することにより、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

【服薬告知書・中間箱のサイズ縮小】

商品名	包装	服薬告知書サイズ<縦×横(mm)>		中間箱サイズ<幅×奥行×高さ(mm)>	
		現行品	変更品	現行品	変更品
メファキン「ヒサミツ」錠275	6錠(PTP6錠×1シート)	105×148	95×148	210×160×80	185×108×49

【調剤包装単位(PTP)の変更内容】

①: 商品名ロゴを変更
②: 薬効分類名「抗マラリア剤」を追加

【販売包装単位(ケース)の変更内容】

①: 商品名ロゴを変更
②: 開封ミシン目を追加し、「開封口」を表示
③: 「開封済」を表示
④: 「成分」と「含量」を『組成』に変更

【中間箱の変更内容】

①: 商品名ロゴを変更
②: 「成分」と「含量」を『組成』に変更
③: お客様相談室の表示を削除

